РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(190) **RU 364**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров

Географические указания

Номер государственной регистрации: **364**

Дата подачи заявки: **21.02.2023**

Номер заявки: **2023712944**

Дата государственной регистрации: **28.11.2024**

Опубликовано: **28.11.2024**

Географическое указание:

БАКЧАРСКАЯ ЖИМОЛОСТЬ

Указание товара:
жимолость

Место происхождения (производства) товара (границы географического объекта):
Бакчарский район Томской области

Связь характеристик товара с местом его происхождения (производства):

В настоящее время Россия занимает ведущее место в мировой селекции жимолости синей. В Сибири, в частности на Бакчарском опорном пункте северного садоводства, ныне ОГУП «Бакчарское», работа с жимолостью ведется с 1964 г. и начата одной из первых в стране.

ОГУП «Бакчарское» на сегодняшний день располагает одной из самых больших по площади в России плантацией жимолости – около 50 га, большую часть которой составляют селекционные сады, участки конкурсного и коллекционного изучения.

Бакчарский район Томской области располагает благоприятными природными условиями для возделывания ягодных культур.

Вегетация растений завершается в третьей декаде сентября – начале октября, длина вегетационного периода – 140-170 дней. Сумма активных температур – 1650 °С. Среднегодовая сумма осадков – 430 мм.

Бакчарская жимолость – культура короткого лета и морозных зим. Она не требовательна к условиям выращивания, что является положительной характеристикой в условиях резко континентального климата. Основным преимуществом жимолости при коротком, но теплом лете – ее раннеспелость. В Бакчарском районе созревание и сбор ягод жимолости проходит во второй, третьей декадах июня. В годы с поздней и холодной весной созревание её сдвигается на первую половину июля. Важным свойством Бакчарской жимолости является отсутствие «вторичного цветения» осенью, так как вегетация в условиях Бакчарского района заканчивается в конце сентября – начале октября и растения «уходят» в состояние покоя, готовясь зимовать без стрессовых ситуаций.

В условиях суровой, продолжительной зимы и холодной весны преимущество Бакчарской жимолости – ежегодное и обильное плодоношение, так как она не боится заморозков, которые неизбежно случаются во второй половине мая в Бакчарском районе, а также ее биологическая долговечность. Высаженная однажды, она плодоносит в течение 20-30 лет.

Бакчарская жимолость реализуется на территории Бакчарского района Томской области, а также поставляется в другие регионы Российской Федерации.

Бакчарская жимолость участвовала в проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в 2020-2022 годах.

Описание характеристик товара:

1. Внешний вид Бакчарской жимолости.

Жимолость синяя с обозначением «Бакчарская жимолость» представляет собой кустарник высотой до 1,6-2,1 м.

Форма кустов разнообразна:

- овальная, скелетные ветви прямые, с чуть свешивающейся верхушкой;
- полушаровидная, направление боковых скелетных ветвей широко в стороны, верхушки ветвей арковидно-изогнуты;
- округлая, скелетные ветви прямые, кусты с возрастом загущающиеся;
- овальная, скелетные ветви прямые, куст сжатый, загущенный;
- округлая, скелетные ветви прямые, разреженные;
- овальная, скелетные ветви прямые, куст разрежен.

Вес ягод: 0,7-3,0 г; длина: 2,1-4,9 см; диаметр: 0,9-1,5 см.

Формы ягод:

- овальные или удлиненно-овальные;
- грушевидные и удлиненно-грушевидные;
- широко-веретеновидные;
- веретеновидные или стручковидные.

2. Степень и одновременность созревания ягод.

Степень и одновременность созревания ягод колеблются по годам и зависят от погодных условий во время опыления и формирования урожая. В годы с теплой и сухой весной и жарким началом лета созревание почти всех сортов проходит быстро и дружно. Если же стоит холодная и дождливая погода, то созревание затягивается.

3. Сорта по характеру и срокам созревания:

- рано и дружно созревающие;
- очень рано, но неравномерно и растянуто, так как из-за загущенности куста ягоды на нижних ветвях и в глубине его созревают позднее на несколько дней;
- сорта среднего срока созревания;
- сорта среднепозднего и позднего созревания.

4. Урожайность.

Средняя урожайность колеблется от 1,9 до 3,8 кг с куста. В отдельные годы максимальный урожай составил 6,5 кг с куста.

5. Вкус: кисло-сладкий, десертный вкус (дегустационная оценка 4,8-5,0 балла). Некоторые сорта со слабой горчинкой в засушливые годы, терпкие.

6. Усиление отрыва плодов от плодоножки.

Жимолость разделена на три группы сортов:

- неосыпающиеся – усилие отрыва ягод от 104 до 158 г;
- слабоосыпающиеся – осыпаемость до 5-10 %, имеют сухой отрыв, возможен сбор путем отряхивания (усилие отрыва от 70 до 100 г);
- осыпающиеся – осыпаемость более 30 %, собирать ягоды лучше путем отряхивания (усилие отрыва ниже 70 г).

7. Физико-химические показатели.

Бакчарская жимолость является источником высокого содержания антоцианов.

В плодах Бакчарской жимолости выявлены цианидин-3,5-ди-О-глюкозид, цианидин-3-О-глюкозид, пеонидин-3-О-глюкозид, пеларгонидин-3-глюкозид.

Способ производства товара (условия его хранения и транспортировки):

Размножение саженцев жимолости происходит методом зелёного черенкования, с использованием плёночных теплиц, в которых поддерживается определённая температура и влажность. Почва – смесь песка и чернозема. После укоренения, осенью, черенки проверяются на наличие образовавшегося корня и одревеснение. Пригодные черенки отправляются на посадку в питомник, открытый грунт. Жёсткое соблюдение условий тепличного роста позволяет добиться укоренения более 90 % посаженных зелёных черенков. До трехлетнего возраста саженцы находятся в питомнике, который разделен на клетки, по сортам и году высадки в питомник, что обеспечивает сортовую чистоту производства. За ними осуществляется уход (прополка, полив, рыхление почвы). При выкопке и передаче в реализацию, саженцы подвергаются проверке на соответствие стандарту корневой системы и надземной части саженца. Производится также ежегодное внесение органических удобрения, без использования ядохимикатов и своевременный уход.

На садовом участке расстояние между кустами жимолости должно быть не менее 1,5 м. Перед посадкой почву очищают от сорняков, особенно многолетних. Осенью под перекопку вносят органические удобрения (навоз, перегной, компост, торф) 8-10 кг/кв.м. При недостатке органических удобрений их можно вносить в ямы, до 10 кг на куст, добавить 40-50 г суперфосфата и столько же калийной соли. Почва для жимолости должна быть плодородной и не кислой, для чего при посадке в яму добавляют около одного ведра компоста или перегноя и 0,5 литра золы. Сажают 2-3-летние саженцы в ямы размером 60х60х50 см. Длинные корни укорачивают до 30 см. На дно насыпают питательную смесь. Корни саженцев перед посадкой обмакивают в земляную болтушку. Для получения земляной болтушки в междурядье выкапывают яму, заливают водой, насыпают в воду земли и перемешивают до сметанообразного состояния. Ставят саженец на дно ямы, корни равномерно расправляют и засыпают землей. При посадке следят, чтобы корневая шейка размещалась на уровне земли или ниже на 3 см. Почву вокруг куста утаптывают, обильно поливают, сверху засыпают (мульчируют) рыхлой землей, торфом или перегноем на 1-2 см. Закладывается жимолость по схеме 4 м междурядье и 1,2 м в ряду. На один гектар требуется 2083 растения.

Сбор ягод.

После определения зрелости ягоды по окрасу, свойственному выращиваемому сорту, и выявления легкоотделения от плодоножки, осуществляется сбор ягод жимолости.

Заморозка ягод.

Часть ягод подвергается заморозке. Для заморозки ягоды упаковываются в герметичные полиэтиленовые мешки, до 30 кг ягоды в каждом. К заморозке допускаются ягоды жимолости одного помологического сорта, зрелые, чистые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями. Допускаются к заморозке ягоды половинками, кубиками, дольками, кусочками без чашелистиков и плодоножек или с плодоножками и чашелистиками. Массовая доля быстрозамороженных ягод со всеми видами отклонений от значений не должна превышать: 10 % – для высшего сорта; 20 % – для первого сорта; 30 % – для второго сорта.

Транспортировка и условия хранения.

Саженцы отправляются с открытой корневой системой.

Отправка саженцев осуществляется весной в мае и осенью в сентябре.

При транспортировке саженцев влажные корни оборачиваются влажными опилками (мхом), затем в пленку и полипропиленовый мешок. Каждый саженец оснащен биркой с наименованием сорта.

Транспортирование и хранение замороженной ягоды осуществляется при температуре не выше -18 °С и относительной влажности воздуха не более 95 %.

Саженцы жимолости с закрытой корневой системой хранят в безморозный период на открытых площадках в контейнерах с обеспечением систематического полива.

Зимнее хранение готовых саженцев производится в закрытом грунте под снегом на специальных площадках (земельных участках).

Предназначенные для весенней реализации саженцы жимолости с закрытой корневой системой, предварительно извлеченные из контейнеров, связанные в пучки по 25 шт. и упакованные в перфорированные полиэтиленовые мешки с увлажненным субстратом, хранят в холодильных камерах. Температура хранения от -20 °С до +30 °С включительно, не допуская подсушивания.

Допускается хранение саженцев жимолости в открытом грунте прикопанными во влажной почве так, чтобы почва плотно прилегала к корням и укрывала корневую систему и стволик на высоту не менее 10 см.

Порядок контроля за соблюдением условий производства и сохранением характеристик товара:

Контроль за соблюдением условий производства и сохранением характеристик жимолости осуществляется в соответствии с внутренними документами и нормативными документами (ГОСТ Р 59653-2021, ГОСТ 33823-2016) в части ягод, посадочного материала и включает следующие меры:

- определяются показатели соответствия саженцев и ягод;
- составляются агротехнологические карты для выращивания саженцев и ягод;
- обеспечивается применение методов и инструментов контроля соответствия агротехнологического процесса требованиям и условиям, установленным в картах;
- осуществляется проверка оборудования и режимов его работы на предмет соответствия выращивания и ухода за саженцами и ягодами требованиям и сохранности уникальных свойств;
- используются контрольно-измерительные приборы, применяемые при выращивании саженцев и производстве ягоды;
- проводится инструктаж работников по соблюдению условий производства и сохранению характеристик саженцев и ягод;
- производится выявление причин несоответствия условий производства и сохранения характеристик жимолости при их выявлении в процессе контроля;
- мониторинг изменений законодательной и нормативной правовой базы, касающихся агротехнологического обеспечения выращивания ягодных культур.

Также к контролю за соблюдением условий производства и сохранением характеристик жимолости включаются следующие мероприятия.

Перед посадкой саженцев и ежегодно в процессе выращивания с участка высадки отбираются пробы земли на анализ на содержание тяжелых металлов и пестицидов. Анализы проводятся в аккредитованной лаборатории.

В процессе выращивания саженцев 1 раз в полгода производится контроль за сохранением свойств сорта. Для этого производится выборка (5 саженцев с каждых 10 кв. м насаждений) и последующий описательный анализ на соответствие сортовым характеристикам. Контроль производится в лаборатории. По результатам такого контроля оформляется заключение о соответствии заявленным сортовым характеристикам.

Перед упаковкой и отправкой саженцев производится визуальный контроль каждого саженца на соответствие требованиям нормативным документам и сортовым характеристикам.

В процессе сбора ягоды отбираются пробы ягод на полный физико-химический анализ, по результатам которого выдается заключение и полный химический анализ, который проводится аккредитованными и аттестованными лабораториями. При соответствии полученных результатов нормативам жимолость отпускается потребителям.

Контроль за соблюдением условий хранения саженцев и ягод на территории – ежедневно.